



SÍNDROME DE CHURG-STRAUSS EN ATENCIÓN PRIMARIA

N. Comabella Contreras; I. Unió Ochoa; S. Bauer Izquierdo; M. Martínez Fort; J. Sanfélix Genovés

El Síndrome de Churg-Strauss es una vasculitis sistémica cuyo diagnóstico y tratamiento precoz mejora tanto la calidad de vida del paciente como su pronóstico vital, de ahí su importancia de ser diagnosticado en la consulta de atención primaria.

Presentamos el atípico caso de una mujer, de 22 años con antecedentes personales de pitiriasis versicolor, asma leve persistente y urticaria física o a fármacos. Acude a la consulta por crisis asmática y angioedema en hemicara superior. Asocia lesiones en MMII, eritematovioláceas, que no desaparecen a la vitopresión, junto edema no foveado en ambos miembros inferiores. Se instaura tratamiento con corticoterapia vía oral e inhaladores remitiendo por completo tanto la crisis asmática como las lesiones cutáneas. En analíticas seriadas destaca: eosinofilia del 32%, FR 226, ANA, C3 y C4 normales. La radiografía de tórax no presentó infiltrados ni cavitaciones.

Ante la presencia de nuevos brotes similares que mejoran con tratamiento corticoideo, se deriva a Medicina Interna donde es diagnosticada de Síndrome de Churg-Strauss mediante biopsia cutánea.

El síndrome de Churg-Strauss es una patología que, aunque poco prevalente, debe ser sospechada en casos de asma con eosinofilia persistente, ini-

ciándose entonces la búsqueda de algún signo de vasculitis extrapulmonar. El papel del médico de atención primaria es esencial para el diagnóstico y tratamiento precoz de esta patología, mejorando el pronóstico vital del paciente.